

# Nuchter zijn voor operatie, behandeling of onderzoek: TABLETTEN





Patiëntenvoorlichting: [patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl](mailto:patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl)

INW01ITXT / Nuchter zijn voor operatie, behandeling  
of onderzoek: TABLETTEN / 20-06-2018

# **Nuchter zijn voor operatie, behandeling of onderzoek: TABLETTEN**

**Binnenkort hebt u een afspraak voor een onderzoek of behandeling in het Catharina Ziekenhuis waarvoor u nuchter moet zijn. Dit betekent dat u voorafgaand aan het onderzoek, gedurende langere tijd niets mag eten of drinken. Dit kan problemen opleveren met uw bloedglucosewaarden. Om eventuele problemen te voorkomen, is het belangrijk dat u de richtlijnen in deze folder goed leest en opvolgt.**

In de schema's op de volgende pagina's, kunt u vinden of u uw tabletten of GLP-1 analoog wel of niet moet innemen/injecteren. De aanpassingen in uw medicatie zijn afhankelijk van uw diabetesbehandeling en of u wel of geen licht ontbijt mag hebben.

Indien u beschikt over een bloedglucosemeter, kunt u op de dag van en na het onderzoek uw bloedglucose een enkele keer meten.

**U neemt vooraf contact op met uw diabetesbehandelaar, indien:**

- U de dag vóór het onderzoek of behandeling al voorbereidingen moet treffen (bijv. een dieet of laxeren).
- U een onderzoek moet ondergaan, waarbij contrastvloeistof ingespoten wordt en u slikt Metformine, Forxiga of Jardiance.

Op welk moment u uw diabetesmedicatie in mag nemen, leest u hieronder. Dit is onder andere afhankelijk van het tijdstip waarop de ingreep plaatsvindt.

## **Als de ingreep voor 12.00 uur plaatsvindt en u nuchter blijft vanaf 24.00 uur**

### **U gebruikt één van deze tabletsoorten**

Acarbose (Glucobay), Actos (Pioglitazon), Avandia (Rosiglitazon), Forxiga (Dapagliflozine), Galvus (Vildagliptine), Gliclazide (Diamicron), Glimepiride (Amaryl), Glipizide (Glibenese), Glibenclamide (Daonil), Januvia (Sitagliptine), Jardiance (Empagliflozine), Metformine (Glucophage), Novonorm (Repaglinide), Onglyza (Saxagliptine), Tolbutamide (Rastinon).

### **Tijdstip waarop u uw medicatie voor diabetes normaal gesproken inneemt**

Voor het ontbijt én voor de lunch.

### **Wanneer mag u uw medicijnen voor diabetes innemen?**

- In de ochtend géén tabletten voor de diabetes innemen.
- Gebruikt u 2x daags tabletten? Neem dan de ochtenddosering alsnog bij de lunch in.
- Gebruikt u 3x daags tabletten? U kunt de ochtenddosering overslaan. Bij de lunch kunt u de gebruikelijke dosering hervatten.

## **Als de ingreep na 12.00 uur plaatsvindt en u nuchter blijft vanaf 24.00 uur**

### **U gebruikt één van deze tabletsoorten**

Acarbose (Glucobay), Actos (Pioglitazon), Avandia (Rosiglitazon), Forxiga (Dapagliflozine), Galvus (Vildagliptine), Gliclazide (Diamicron), Glimepiride (Amaryl), Glipizide (Glibenese), Glibenclamide (Daonil), Januvia (Sitagliptine), Jardiance (Empagliflozine), Metformine (Glucophage), Novonorm (Repaglinide), Onglyza (Saxagliptine), Tolbutamide (Rastinon).

### **Tijdstip waarop u uw medicatie voor diabetes normaal gesproken inneemt**

Voor het ontbijt én voor de lunch.

### **Wanneer mag u uw medicijnen voor diabetes innemen?**

- U neemt geen tabletten voor de diabetes in.
- U hervat uw diabetesmedicatie weer bij de eerstvolgende maaltijd.

## **Als de ingreep na 12.00 uur plaatsvindt en u een licht ontbijt (twee beschuiten en een kop thee) gebruikt**

### **U gebruikt één van deze tabletsoorten**

Acarbose (Glucobay), Actos (Pioglitazon), Avandia (Rosiglitazon), Gliclazide (Diamicron), Glimepiride (Amaryl), Glipizide (Glibenese), Glibenclamide (Daonil), Novonorm (Repaglinide), Tolbutamide (Rastinon), Metformine.

### **Tijdstip waarop u uw medicatie voor diabetes normaal gesproken inneemt**

Voor het ontbijt én voor de lunch.

### **Wanneer mag u uw medicijnen voor diabetes innemen?**

- U neemt geen tabletten voor de diabetes in.
- U hervat uw diabetesmedicatie weer bij de eerstvolgende maaltijd.

### **Gebruikt u één van deze tabletsoorten?**

Forxiga (Dapagliflozine), Galvus (Vildagliptine), Januvia (Sitagliptine), Jardiance (Empagliflozine),

Dan gelden de volgende richtlijnen:

- Gebruikt u de medicatie voor het ontbijt? Dan kunt u de gebruikelijke ochtenddosering van uw diabetesmedicatie innemen.
- Gebruikt u de medicatie voor de lunch? Dan neemt u géén diabetesmedicatie in. U hervat uw diabetesmedicatie weer bij de eerstvolgende maaltijd.

## **GLP-1 Analooq**

### **Als de ingreep voor of na 12.00 uur plaatsvindt en u nuchter blijft vanaf 24.00 uur**

- Victoza (Liraglutide): Voor het ontbijt kunt u de gebruikelijke dosering injecteren.
- Trulicity (Dulaglutide): Voor het ontbijt kunt u de gebruikelijke dosering injecteren.
- Bydureon (Exenatide) Voor het ontbijt kunt u de gebruikelijke dosering injecteren.
- Byetta (Exenatide): Ochtendinjectie niet spuiten. Byetta herstart u bij de avondmaaltijd, indien u weer mag eten

### **Als de ingreep na 12.00 uur plaatsvindt en u een licht ontbijt (twee beschuiten en een kop thee) gebruikt**

- Victoza (Liraglutide): Voor het ontbijt kunt u de gebruikelijke dosering injecteren.
- Trulicity (Dulaglutide): Voor het ontbijt kunt u de gebruikelijke dosering injecteren.
- Bydureon (Exenatide): Voor het ontbijt kunt u de gebruikelijke dosering injecteren.
- Byetta (Exenatide): Voor het ontbijt kunt u de gebruikelijke dosering injecteren.

## **Toch een hypo?**

Mocht u ondanks de juiste voorzorgsmaatregelen toch hypo verschijnselen krijgen (zoals honger, zweten, beven, trillen, bleekheid, wazig zien, hoofdpijn en duizeligheid) of een bloedglucosewaarden < 4,0 mmol/l hebben, drink dan 1 glas limonade van 0,4 dl ranja (2 cm aangevuld met water). Ook kunt u 5 tabletten druivensuiker innemen.

U doet er goed aan druivensuiker tabletten mee te nemen naar het ziekenhuis. Mochten de voorzorgsmaatregelen onverhoopt niet voldoende zijn, dan heeft u toch iets bij de hand om een hypo te behandelen.

## **Vragen**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw eigen diabetesverpleegkundige of met de diabetesverpleegkundigen in het Catharina Ziekenhuis.

## **Contactgegevens**

Catharina Ziekenhuis

040 - 239 91 11

[www.catharinaziekenhuis.nl](http://www.catharinaziekenhuis.nl)

Diabetesverpleegkundigen


040 - 239 59 22 (ma t/m vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur en 11.30 tot 12.30 uur)


Routenummer(s) en overige informatie over de

diabetesverpleegkundigen kunt u vinden op

[www.catharinaziekenhuis.nl/inwendige-geneeskunde](http://www.catharinaziekenhuis.nl/inwendige-geneeskunde)











Altijd als eerste op de hoogte?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief:

**[www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief](http://www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief)**

Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven  
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven