

Anorectale manometrie





Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl

MDL001/ Anorectale manometrie /10-11-2017

Anorectale manometrie

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een anorectale manometrie te laten doen. Uw arts heeft u hierover geïnformeerd. Het onderzoek wordt gedaan door een hiervoor opgeleide endoscopieverpleegkundige. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rondom dit onderzoek.

Wat is een anorectale manometrie?

Een anorectale manometrie is een onderzoek waarbij de spanning van uw rectum en anus kan worden opgemeten. Dit gebeurt met behulp van een flexibele katheter. Deze katheter bestaat uit een dun flexibel slangetje met op de tip een ballonnetje. De katheter is aangesloten op een computer die de metingen registreert en weergeeft in grafieken. Voorbereiding Er zijn geen bijzondere voorbereidingen voor dit onderzoek nodig.

Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken dag en tijd op de afdeling Endoscopie. De endoscopieverpleegkundige roept u binnen wanneer u aan de beurt bent. U doet dan uw schoenen en uw broek of rok uit. Daarna neemt u plaats op de onderzoekstafel, uw onderbroek schuift u vervolgens naar uw knieën en uw onderlichaam wordt bedekt.

Hierna gaat u op uw linkerzijde liggen. De verpleegkundige brengt de katheter voorzichtig via de anus ongeveer tien centimeter in het rectum. De verpleegkundige beweegt dan de katheter voorzichtig op en neer, om de spanning van de spieren op verschillende plaatsen te kunnen registreren. Vervolgens wordt de katheter op de bil vastgemaakt met behulp van een pleister en gaat de meting verder. Tijdens het onderzoek vraagt de verpleegkundige u om een aantal keren de anus dicht te knijpen, te persen en te hoesten. Hierbij wordt de druk voortdurend opgemeten.

De ballontip van de katheter wordt langzaam met lucht gevuld. U geeft dan steeds aan wanneer u de ballon niet goed of juist heel goed voelt en wanneer u aandrang tot ontlasting krijgt. Het inbrengen van de katheter in de anus kan een vreemde gewaarwording zijn. Pijnlijk is het niet.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten. Houd er rekening mee dat door onverwachte omstandigheden de wachttijd soms tot meer dan een uur kan oplopen.

Nazorg

Er is geen nazorg nodig voor dit onderzoek.

Wanneer neemt u direct contact op?

Het is mogelijk dat er licht bloedverlies is, doordat er een scheurtje in de anus of de darmwand ontstaat. Dit bloedverlies verdwijnt meestal binnen 12 tot 24 uur. Waarschuw uw arts als u langer dan deze aangegeven tijd klachten houdt. Neem hiervoor binnen kantooruren contact op met de afdeling Endoscopie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw arts tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Kunt u om dringende redenen niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Endoscopie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Endoscopie.

Tot slot

Wilt u er aan denken om bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw patiëntenpas mee te nemen, als u die heeft?

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis

040 - 239 91 11

www.catharinaziekenhuis.nl


Afdeling Endoscopie


040 - 239 87 85

Spoedeisende Hulp

040 - 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Echoscopie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten









Altijd als eerste op de hoogte?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief:

www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief

Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven